







## Modo de uso

Es recomendable que cualquier producto agrícola sea utilizado (dosis, tiempo y forma de aplicación) en base a un diagnóstico certero sobre vuestro cultivo.



APLICACIÓN FOLIAR

USAR DURANTE ÉPOCA DE CRECIMIENTO DE HOJAS, BROTES Y FRUTOS.

Diluir al 0,3 % (300cc en 100 litros de agua)

✓ En forma frecuente, para la mantención de los altos niveles de fitoalexinas.

\* Recomendamos contactar a nuestro departamento técnico, para calcular el gasto exacto de producto, según vuestra superficie, ya que existe una gran variabilidad en la condición del cultivo y volumen de agua al aplicar.

## Compatibilidad / Precauciones

KUP® puede ser usado con la mayoría de los agroquímicos excepto con dicofol, dimetoato, productos cálcicos aceites o cobres no quelatados. No obstante, puede ser empleado una semana antes o tres semanas después de la utilización de los productos prohibidos.

Cuando la aplicación de KUP® es individual, se puede agregar un tensioactivo no iónico, no polar de acuerdo a las indicaciones sugeridas por el fabricante de este.

Compatible con Nutrihelp Multi Hierro®, Nutrihelp Multi®, Extra Brix® y Cold Killer®. **Mezclar con Nutrihelp CalcioBoro para aumentar movilización del Calcio.**

Usar como cualquier agroquímico general, considerando las precauciones de manejo de este tipo de productos y los cuidados personales pertinentes.

No aplicar en horas de máxima radiación solar.

## Aplicación

1



Lavar estanque y llenar hasta la mitad con agua

2



Agregar dosis de KUP® según corresponda

3



Completar estanque con agua, sin dejar de agitar

Ejemplo bomba de 15 litros: **45 cc por cada 15 litros de agua**

Composición	% P/ P
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	40
Potasio (K <sub>2</sub> O)	20

CULTIVO	EPOCA DE APLICACION	DILUCION en 100 Lts de agua	DOSIS Lt/Ha
Hortalizas en general	15 – 20 días post trasplante 1 o 2 veces por mes	200 - 300	1 - 3
Melón, sandía	10 – 15 días post trasplante 1 o 2 veces por mes	200 - 300	1 - 3
Papas	15 – 20 días post emergencia 1 vez por mes en forma preventiva 2 veces al mes en forma curativa.	200 - 300	1 - 3
Durazno, nectarin, damasco, ciruelo, cerezo almendro, nogal	Desde fruto cuajado 3 – 4 aplicaciones durante la temporada	200 - 300	3 - 5
Manzano, peral	Brotación 1 aplicación 10 días post fruto cuajado 2 – 3 aplicaciones (1 vez por mes). Post cosecha 1 – 2 aplicaciones	200 - 300	3 - 5
Uva (vinífera, pisquera, mesa)	Brotación 1 aplicación al inicio, la 2ª a los 20 días, la 3ª al mes. Uva vinífera y pisquera (dosis más baja)	200 - 300	3 - 5
Kiwi	Brotación 1 aplicación al inicio, la 2ª a los 20 días post cuaja de fruto	200 - 300	3 - 5
Arándano, frambuesa, frutilla, grosella, mora, zarzaparrilla.	Desde Brotación 1 vez al mes. Post cosecha 1 – 2 aplicaciones.	200 - 400	2 - 4
Cítricos, paltos, olivos	Desde crecimiento vegetativo 1 vez al mes. En desarrollo de frutos 2 a 3 aplicaciones.	300 – 400	5 - 6